Beispiel-Score Sheet, geeignet für Mäuse und mittleren Belastungsgrad

Kategorie	**Bewertung**	**Score**	**Datum**
Pflegezustand	Fell glatt, glänzend und Augen/Körperöffnungen unauffällig	0	
	keine Fellpflege oder stumpfes Fell oder Augen etwas eingesunken oder Körperöffnungen leicht verschmutzt	1	
	keine Fellpflege und struppiges Fell oder Augen geschlossen	2	
	struppiges Fell und Aufrichten der Körperhaare (Piloerektion), Augen geschlossen und verklebt, Körperöffnungen verklebt	Versuchs-abbruch	
Körperhaltung	normal	0	
	leicht gekrümmt und Gesicht normal	1	
	gekrümmter Rücken und Gesicht angespannt	2	
	stark gekrümmter Rücken und Beine unter den Bauch gestellt oder Bauch auf den Boden gepresst und Gesicht angespannt und Ohren angelegt	Versuchs-abbruch	
Atmung	regelmäßig	0	
	erschwerte (pumpende oder sehr flache) Atmung	Versuchs-abbruch	
Verhalten/ Mobilität	Normal und reagiert prompt	0	
	leicht reduzierte Aktivität oder wenig Bewegung und reagiert prompt	1	
	leicht reduzierte Aktivität und wenig Bewegung oder isoliert und unsicherer Gang/reagiert verlangsamt	2	
	Apathisch oder schwankende Bewegung oder Ataxie	Versuchs-abbruch	
Versuchsbedingte Kriterien *bitte an den eigenen Versuch anpassen z.B. Tumorgröße und Beschaffenheit / Operationswunde*	kein Tumorwachstum Operationswunde reizlos	0	
	Tumordurchmesser ≤ 10 mm Operationswunde leicht gerötet oder Nahtdehiszenz < 3 mm	1	
	Tumordurchmesser > 10 mm bis ≤ 15 mm Operationswunde geschwollen und gerötet und schmerzhaft, Nahtdehiszenz ≥ 3 mm aber nur oberste Wundschicht	2	
	Tumordurchmesser > 15 mm oder ulzeriert Operationswunde eitrig/nekrotisch oder durch alle Gewebeschichten eröffnet	Versuchs-abbruch	
Ernährungszustand Body condition score und / oder Gewicht bezogen auf das Ausgangsgewicht, korrigiert um die erwartete Gewichtszunahme	Wirbel und Beckenknochen nur mit leichtem Druck palpierbar oder normales Gewicht, kontinuierliche Zunahme (Schwankungen um 5%)	0	
	Abnahme des Gewichts > 5 bis ≤ 10%	1	
	Wirbel sichtbar oder Beckenknochen palpierbar oder Abnahme des Gewichts > 10 bis < 20%	2	

gleichalter, gleichgeschlechtlicher Tiere derselben Linie im Beobachtungszeitraum	Wirbel und Beckenknochen sichtbar oder Abnahme des Gewichts ≥ 20%	Versuchs-abbruch	
	Punktsumme:		
Außerordentliche Maßnahmen	Bei Vergabe von 3 x 2 Punkten *Bei den genannten Punkten handelt es sich um Beispiele und sie sollten, je nach Eingriff, bitte noch erweitert und angepasst werden.*	Versuchsabbruch	
Bewertung			
0	normal		
1 - 2 Punkte	erhöhte Überwachung (*konkrete Angabe der Häufigkeit*), Gabe von Weichfutter/aufgelöstes Milchpulver für Tiere		
3 - 5	erhöhte Überwachung (*konkrete Angabe der Häufigkeit, diese sollte etwas häufiger stattfinden als bei Vergabe von 1-2 Punkten*) eventuell Erhöhung der Frequenz der Gewichtskontrolle (*abhängig vom Versuchsdesign könnte dies notwendig sein, dann sollte aber auch die Frequenzhäufigkeit in Zahlen benannt sein)* eventuell Gabe von Schmerzmittel (*abhängig vom Versuchsdesign könnte dies notwendig sein, Angabe von Dosis, Applikationsform, Wirkstoff)* Gabe von Weichfutter/aufgelöstes Milchpulver für Tiere/hochkalorisches Futter Ggf. Wundbehandlung wie erneuter Verschluss der Operationswunde Keine Verbesserung nach 48 Stunden → Euthanasie		
6 - 7 Punkte	erhöhte Überwachung (*konkrete Angabe der Häufigkeit*), Gabe von Schmerzmitteln (*unter Angabe von Dosis, Applikationsform, Wirkstoff*), Erhöhung der Frequenz der Gewichtskontrolle (Häufigkeit mindestens täglich), Gabe von Weichfutter/aufgelöstes Milchpulver für Tiere/hochkalorisches Futter Keine Verbesserung nach 24 Stunden→ Euthanasie		
8 und mehr Punkte	Leiden der Tiere erreicht den definierten humanen Endpunkt → Euthanasie		

Bei unvorhergesehenen Symptomen oder Unsicherheiten in der Bewertung und Behandlung muss der Versuchsleiter oder Stellvertreter hinzugezogen werden. Es kann tierärztlicher Rat (gem. Punkt 1.9) eingeholt werden.